

Stratégie de port du masque à la date du 18 mars 2020

Objectif : protéger les patients/résidents et les professionnels soignants lors des soins avec contact rapproché à moins d'un mètre et rationaliser l'usage des masques

Important : port de masque inutile pour les services supports (logistique, informatique, technique et ingénierie, biomédical, pharmacie, cuisine...) et les services administratifs.

Masque de soin

Je prends en charge **tout patient COVID-19** suspect ou confirmé ou toute personne avec des signes d'infection respiratoire



Il porte un **masque de soin**

Je suis un **professionnel non soignant en contact rapproché** avec les patients



Je porte un **masque de soin**

Masque chirurgical (type II)

Dotation de deux masques par professionnel soignant et par jour

Je suis un **professionnel soignant en contact rapproché** avec les patients



Je porte un **masque chirurgical** que je peux garder pour plusieurs patients

Je suis un **professionnel soignant** et je réalise des **soins sans risque d'aérosolisation** à des patients COVID confirmé ou possible (recherche COVID en cours)



Je porte un **masque chirurgical**

Je suis un **professionnel chargé des premiers secours** ou en charge **du transport sanitaire**



Je porte un **masque chirurgical** pour la prise en charge d'une **personne présentant des signes d'infection respiratoire** évoquant un COVID-19 ou un patient COVID-19

Masque FFP 2 réservé exclusivement

Je suis un **professionnel soignant** et je réalise des **soins à des patients placés en précautions AIR** (tuberculose, rougeole, varicelle)



Je porte un **masque FFP 2**

Je suis un **professionnel soignant** et je réalise des **manœuvres au niveau de la sphère respiratoire avec risque d'aérosolisation** (ex : intubation, extubation, fibroscopie bronchique, kiné respiratoire, prélèvement naso-pharyngé...)



Je porte un **masque FFP 2** et une **protection oculaire**

Je suis un **prestataire de service ou un distributeur de matériel**



Je me rapproche du cadre de l'unité pour **avoir les consignes concernant mon intervention**



Bien l'ajuster au visage, ne pas le manipuler inutilement, le changer toutes les 4 heures pour les masques de soin ou chirurgicaux et 8 heures pour les masques FFP2 selon notice du fabricant. Ne pas réutiliser un masque dès lors où il a été manipulé et oté du visage. Renforcer la désinfection des mains par frictions. Stratégie qui s'adaptera aux besoins, à l'évolution de la situation et aux ressources disponibles.