


Surveillance des épidémies hivernales

Phases épidémiques : ■ Pas d'épidémie ■ Post épidémie ■ épidémie

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS)




Evolution régionale :



[Page 2](#)

GASTRO-ENTERITE




Evolution régionale :



[Page 3](#)

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL



Evolution régionale :



[Page 4](#)

Autres données de surveillance régionale

Surveillance des Maladies à déclaration obligatoire

Poursuite de l'épidémie d'hépatite A dans plusieurs départements de la région touchant principalement des hommes.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie Hépatite A dédié accessible ici : [lien](#) et le point national [ici](#)

Epidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine

Au 05 mars 2018, **482 cas** étaient déclarés en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre 2017 : **103 ont été hospitalisés soit 21 %**. Sur la base des données disponibles, 7 cas ont été admis en réanimation dont 1 cas (femme âgée de 31 ans, non vaccinée) qui est décédé dans un contexte de pneumopathie. De nombreux cas groupés émergent dans la région, en particulier dans la communauté des gens du voyage et des étudiants.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie Rougeole dédié accessible ici : [lien](#) et le point national ici : [lien](#)

→ Prévention : [lien](#) et [lien vaccination info service](#)

Mortalité toutes causes (données Insee) (page 5)

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de décès reste dans des fluctuations habituellement observées en cette période de l'année.

Au niveau national, un excès de mortalité toutes causes et tous âges confondus est observé depuis le début de l'épidémie grippale (semaine 49). Toutefois on observe une diminution de la mortalité toutes causes depuis la semaine 02-2018. L'excès de mortalité des semaines 49-2017 à 06-2018 est estimé à 7 % soit environ 8500 décès.

→ Pour plus d'informations, se reporter au Point Epidémiologie national ici : [lien](#)

Faits marquants

Fin de l'épidémie de bronchiolite en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, l'épidémie de bronchiolite a duré 7 semaines, de la semaine 47-2017 à la semaine 01-2018, avec un pic épidémique en semaines 49 et 50-2017 avec environ 20 % de passages aux urgences et 12 % d'actes SOS Médecins parmi les moins de 2 ans. Sur la période épidémique, près de 52 % des cas pris en charge aux urgences ont été hospitalisés.

Cette épidémie d'ampleur modérée a été marquée par une légère recrudescence de l'activité fin-janvier (S04-2018) et une circulation du VRS active jusqu'à la semaine 05-2018 d'après les laboratoires des CHU de Bordeaux, Poitiers et Limoges.

Pendant les semaines épidémiques, le réseau AqRespi a pris en charge environ 1647 enfants avec un pic d'activité lors du week-end de garde de la semaine 52-2017 ; l'activité du réseau est restée très importante jusqu'à la semaine 06-2018.

Au niveau de la France Métropolitaine, la fin de l'épidémie a été déclarée dans la majorité des régions excepté la région PACA et Grand-Est.

BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)

Synthèse des données disponibles : Fin de l'épidémie en Nouvelle-Aquitaine

- SOS Médecins : activité en baisse avec 28 consultations soit 3,8 % de l'activité totale chez les moins de 2 ans (contre 4,5 % en S08)
- Oscour® : activité en baisse avec 83 passages soit 7,1% de l'activité totale chez les moins de 2 ans (contre 8,1 % en S08).
- Données de virologie : 11 prélèvements positifs à VRS (7 au CHU de Bordeaux, 2 au CHU Limoges, 2 au CHU de Poitiers) en semaine 09.
- Données du réseau AquRespi : activité en baisse avec 48 enfants pris en charge par le réseau AquRespi sur le territoire ex-aquitain.

Consulter les données nationales :

- Surveillance de la bronchiolite : [cliquez ici](#)






Figure 1- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, Nouvelle-Aquitaine

Figure 2- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion d'activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, OSCOUR®, Nouvelle-Aquitaine



Semaine	Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, moins de 2 ans	Variation par rapport à la semaine précédente	Nombre total d'hospitalisations codées, moins de 2 ans	Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations codées, moins de 2 ans (%)
2018-S08	58		277	20,94
2018-S09	44	-24,1%		

Figure 3- Evolution hebdomadaire du nombre d'enfant pris en charge par le réseau AquRespi

Figure 4- Nombre d'hospitalisation pour bronchiolite, tous âges, Oscour®, Nouvelle-Aquitaine

Prévention de la bronchiolite

Recommandations sur les mesures de prévention

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d'une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les "doudous").

La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d'hygiène :

- le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas
- éviter autant que possible d'emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports en commun, hôpitaux...)
- le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...)
- l'aération régulière de la chambre
- éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés <http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf>